



Stickstoffbedarf nach Ernte der Hauptfrucht auf Ackerland – Herbst 2018 *)

Gilt nur zu Winterraps, Zwischenfrüchten vor Sommerungen, Feldgras ohne Nutzung, Wintergerste nach Getreidevorfrucht gemäß **DÜV § 6.9 Sperrfrist auf Ackerland**

Betrieb: _____

Betriebsnummer: _____

Datum der Bedarfsermittlung: _____

Achtung: gilt nur für den Herbst 2018. Änderungen sind für wassersensible Gebiete möglich. Im Folgejahr muss zur Hauptfrucht eine N-Bedarfsermittlung erfolgen!

Kultur	Schlagbezeichnung, Bewirtschaftungseinheit	Vorfrucht	Stickstoffdüngbedarf Herbst
<i>Wintergerste</i>	<i>Musterschlag</i>	<i>Winterweizen</i>	<i>Max. 60 kg Ges-N/ha oder 30 kg NH₄-N/ha</i>
<i>Zwischenfrucht ohne Legum.</i>	<i>Beispiel 1</i>	<i>Wintergerste</i>	<i>Max. 60 kg Ges-N/ha oder 30 kg NH₄-N/ha</i>

Achtung: auf Ackerland kein Düngbedarf nach Winterraps, Leguminosen, Brache, Gemüse, Mais, Zuckerrüben, Dauergrünland, Kartoffeln, Leguminosen-Gemenge > 50 % Leguminosen